

DESATERO

PRO RODIČE

před nástupem dítěte do školky



**OCHRANA PŘED
INFEKČNÍMI NEMOCAMI**
před vstupem do kolektivu

10 dobrých rad,

které usnadní vám i vašemu dítěti

1

MLUVTE S DÍTĚTEM O TOM, CO SE VE ŠKOLCE DĚLÁ A JAKÉ TO TAM JE.

Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2

ZVYKEJTE DÍTĚ NA ODLOUČENÍ.

Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3

VEĎTE DÍTĚ K SAMOSTATNOSTI ZVLÁŠTĚ V HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ A JÍDLE.

Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4

DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO PŘÍPADNÝM OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY.

Ujistěte dítě, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu **NIKDY ŠKOLKOU DÍTĚTI NEVYHROŽUJTE** (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5

POKUD BUDE DÍTĚ PLAKAT, BUĎTE PŘÍVĚTIVÍ, ALE ROZHODNÍ.

Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychllo nebo tajně, ani ve vztek po hádce s dítětem.

nástup do školky



6

DEJTE DÍTĚTI S SEBOU
NĚCO DŮVĚRNÉHO.

(Plyšáka, hračku, šátek).

7

PLŇTE SVÉ SLIBY.

Kkdyž řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8

PLATÍ, že zavit se své úzkosti znamená zavit dítě jeho úzkosti

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9

ZA POBYT VE ŠKOLCE NESLIBUJTE DÍTĚTI ODMĚNY PŘEDEM.

Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10

PROMLUVTE SI S UČITELKOU O MOŽNOSTECH POSTUPNÉ
ADAPTACE DÍTĚTE

S dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

CHRAŇTE SVÉ DÍTĚ před infekčními chorobami

Nedílnou součástí vstupu vašeho dítěte do mateřské školky je i ochrana jeho zdraví. Děti jsou v tomto věku velmi zvídavé, doslova osahávají, ochutnávají a objevují svět. Pobytem v kolektivním zařízení jsou vystaveny vyššímu riziku nákazy infekčními chorobami, než když trávily většinu času doma. Základní očkování mají již za sebou a je proto vhodný čas doplnit absolvovaná pravidelná očkování i o očkování proti nemocem, které se snadno a rychle šíří právě v dětských kolektivech – jako je například žloutenka typu A nebo plané neštovice.

ŽLOUTENKA typu A

Infekční žloutenka typu A neboli hepatitida A je nakažlivé virové onemocnění jater. Nedá se přímo léčit žádnými léky, je při ní povinná hospitalizace a nutná dlouhodobá jaterní dieta. Klidový režim a dieta jsou doporučovány až několik měsíců po propuštění z nemocnice. Od dětí se mohou nakazit i rodiče, kdy se u starších osob zvyšuje riziko komplikací.

Nakazit se žloutenkou typu A je relativně snadné. Virus je totiž velmi odolný a při pokojové teplotě dokáže dluho přežít kdekoli, ať už v jidle, nápoji, nebo na hračce, kterou si děti s oblibou dávají do úst, což je cesta, která k nákaze zcela postačuje. Důležitou součástí prevence proti žloutence typu A je osobní hygiena – mytí rukou, které ale nemusí k zajištění ochrany stačit. Velmi účinnou formou prevence proti žloutence typu A je očkování např. dvoudávkovou vakcínou Havrix 720 Junior Monodose. Kompletní očkovací schéma vakcíny Havrix 720 Junior Monodose se skládá ze dvou dávek, z nichž druhá se aplikuje v době od 6 měsíců do 5 let, přednostně mezi 6. a 12. měsícem po první dávce. Děti jsou v ČR v raném dětství plošně očkovány pouze proti žloutence typu B. Očkováním proti žloutence typu A tak poskytnete svému dítěti ochranu proti všem typům infekčních žloutenek, kterým lze v současné době předejít očkováním.

PLANÉ NEŠTOVICE,

I znáte je?

Plané neštovice jsou způsobeny virem Varicella zoster a jsou v současnosti jedním z častých infekčních onemocnění dětského věku. Průměrný věk, kdy se děti v ČR nakazí, je cca 6 let – tedy ve věku, kdy jsou v kolektivu s jinými dětmi.

Inkubační doba je průměrně 14–15 dní, ale pacienti jsou infekční až 48 hodin před výsevem neštovic a nakažlivost trvá až do zaschnutí posledních strupů, tedy cca 7 dní. V této době by mělo být dítě izolováno z dětského kolektivu. Onemocnění může narušit chod celé rodiny – pacient nesmí na slunce, někdy nelze dokonce odjet na dovolenou. Snadno se nakazí další vnímavé osoby v domácnosti – osoby, které plané neštovice neprodělaly či proti nim nebyly očkovány.

Pokud chcete Vaše dítě chránit před planými neštovicemi, můžete jej nechat očkovat.



CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT

před nástupem do mateřské školy

Znát své jméno a příjmení.

Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).

Umět si vyčistit zuby.

Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.

Spolupracovat při oblékání a svlékání.

Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

Vysmrkat se a používat kapesník.

Držet lžíci a umět se najíst.

Umět pít z hrnečku a skleničky.

Při jídle sedět u stolu.

Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

O konkrétních požadavcích na vaše dítě se poradte přímo ve vaší mateřské škole.



Dávkovací schéma

• od 1 roku věku dítěte → • po 6 až 12 měsících po první dávce



• věk 9 měsíců a více → • vhodný interval nejméně 6 týdnů

Zeptejte se svého pediatra na možnosti očkování proti planým neštovicím a žloutence typu A.

Stejně jako jiné vakcíny, ani vakcíny Havrix 720 Junior, Varilrix nemusí ochránit 100 % očkovaných.

- Vakcína Varilrix – vakcína proti planým neštovicím. Vakcína Varilrix je registrovaný léčivý přípravek, je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař. Vakcína se aplikuje podkožně formou injekce. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-10/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.
- Havrix 720 Junior Monodose – vakcína proti žloutenci typu A. Vakcína Havrix 720 Junior Monodose je registrovaný léčivý přípravek, je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce. Vakcinační akce č. j.: MZDR 59391/2017-16/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud máte podezření, že Vy nebo Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti hepatitidě A nebo na jakoukoliv látku obsaženou v této vakcíně, informujte o této skutečnosti lékaře Vašeho dítěte.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. O očkování se poradte s lékařem vašeho dítěte. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahláste na [cz.safety@gsk.com](mailto:czech.safety@gsk.com).

Schváleno 4/2018
CZ/HAV72/0002/16(1)

GSK s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4;
e-mail: [cz.info@gsk.com](mailto:czech.info@gsk.com); www.gsk.cz

